

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部  
普濟方卷六十一

詳校臣太醫院恩程臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李棻

謄錄監生臣張恒

欽定四庫全書

普濟方卷六十一

明 周王朱橚 撰

咽喉門

喉痺

治飲食不通欲死者

用臘月蠡魚膽陰乾為末點喉中藥至即瘥病深則  
水調灌之一方用懸枸子葉燒為末服方寸匕或

取汁用

治咽喉不得用針者

以小口瓶內燒蛇床子烟張口受烟一熏即破

潤關住痛

出危氏方

用生薄荷研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多未退再用如更不開可通頂又用葱頭兩箇搥破安牙

牀頭處立開妙

荊芥方

出聖惠方

治喉痺

用荊芥瀝稍稍燻之又以水三升煮荊芥一握取一

升分三服

薑蜜煎

出聖惠方

治喉痺及毒氣方

用生薑二斤擣取汁蜜三合微火煎相和每服一合

日五服

又方

出肘後方

用剥大蒜塞耳鼻孔中日二易

治喉痺卒不得語方

出肘後方

用濃煮桂汁服一升亦可桂末舌下漸嚥之良

又方

一名宣音湯  
出肘後方

煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方

用酒五合和入乳汁半升分二服

又方

出肘  
後方

用燒所算作灰三指撮水服之一方用所算燒為末  
漿水服一匕

又方

出聖  
惠方

用芥子末水和傅之乾則易一方用蜜水和傅於外  
喉下候其乾即易之

治喉痺深腫連頰吐血氣數者名馬喉痺治之方

出聖

惠方

用馬嚼一具水二升煮取一升分三服

又方

出聖惠方

取羶中蒼耳三七枚燒末調服之

又方

出聖惠方

治馬喉痺紅腫連頰吐血氣數

用馬鞭草根一握勿見風截去兩頭擣取汁服

又方

出聖惠方

燒穀奴灰酒服之立破

治走馬喉痺

儒門事親

用生白礬研細塗於綿針上按於喉中立破綿針用  
榆條上以綿纏作棗大是也一方白礬為末化湯灌  
之

又方



以馬勃吹咽喉中立止一方濃煎汁灌之

治纏喉風

出集驗良方

治咽喉生癰藥不下及喉閉等症

用皂角刺不拘多少刮皮浸生麻油以年深為佳遇患以油滴在口中或吐或破即安一方無麻油

治喉風單雙乳鵝

出瑞竹堂方

用牆上土蜂房一箇碾極細先以楮葉將病人舌用藥擦破微令血出將蜂窠土用醋調用鵝毛蘸藥於喉中搥之令痰涎出為效後用扁蓄根搗爛調冷水

與病者只服三口至三行即愈就用冷水漱口立愈

急治喉風

瑞竹堂方

燈草

用一大握  
除去兩頭

右將燈草用新瓦一箇盛之又用新瓦一箇合之以  
火焚燒成灰再將鹽一大匙頭就於瓦上炒存性二  
物相和合用葦筒一箇藥一捻吹於喉中涎出為効  
吹兩次立愈

治喉痺方

用箭頭草葉研入醬少許筆蘸入喉吐其草生於鄉  
村沿籬夏秋開小白花有鈴兒倒垂下其葉畧似木  
香花葉

又方

用白梅肉包生白礬末作丸納喉中一方用江茶和  
為丸噙化下

治纏喉風

出海上  
名方

用白礬末以麻油調下吐即愈

又方

用水酒各半碗共作一碗皂角二箇打碎煎至半碗候溫於病人鼻內注入如咳嗽出風痰時疾愈

又方

出海上方

治喉痺

用羊蹄草牛食者取汁服之立効

又方

出海上方

敗毒散加茯苓半夏同煎服尤驗

治喉閉

用稻草燒烟如做墨法取細烟酸醋調吹入鼻中如  
嚙得用蘆筒送下喉少頃打碓吐出涎立愈

吐涎散

出經驗良方

治喉風吞藥不得不能飲食

用鶴虱二錢半酒一盞醋少許同煎至半盞吞下吐  
出毒涎安

治纏喉風

出經驗良方

用蒼耳草根老薑一塊同研爛濾汁以溫無灰白酒  
浸汁服

治喉閉

出醫方集成

用鼓槌草杜牛膝以二味生搗爛取汁灌下鼻中得吐即為愈一方鼓槌草根洗淨研細用陳醋攪和出汗漱之

又方

出醫方集成

用土烏藥即矮樟根以酸醋兩盞煎一盞先噙後嚥出痰涎為愈

帳頭散

出經驗良方

治喉閉終夜不能言最急病此方雖

不能大効且得喉開可語說證尋醫

用白礬多少置青帳或藍帳角中方便處遇有此證  
嚼帳礬汁吞之如無帳或藍青布帛片將少礬在內  
水濕其片嚼汁吞之如無礬或得青藍衣帛水濕嚼  
汁吞之亦可一方礬石一兩水三升浸洗手足

治喉閉卒不語

濃煮桂汁噙之佳如無桂用火麻子搗碎煎噙之

治急喉風喉閉纏喉風

用蛇皮裹白梅一枚噙之嚥津一方用蛇蛻皮不拘多少揉碎以香爐一箇燒烟令患人用竹筒子吸入喉內熏破一方蛇皮略洗日乾研作細屑白梅為丸含化一方用蛇皮一條新瓦上炒焦黃帶黑色碾細入麝香少許摻口內

治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁吞下或動大腑即解或釀醋同研取汁噙引出涎更



妙

纏喉風咽中氣不得出

用白蛇蛻一條炙黃以當歸等分為末溫酒下一錢  
得吐愈切忌針灸

金銀鎖子 治乳蛾喉閉

用白礬一斤用銅器熬沸隨下江子肉二十四箇再  
熬江子以紙碾江子碎為度出江子將白礬出火毒  
取礬黃色者擣為末治咽喉乳蛾白色者另擣為末

治一切毒物以水調敷中風者水調服之如牙噤指  
甲挑入喉中或竹筒吹入

遠志散 治喉閉

用遠志去心為末以管吹藥入喉低頭涎出即愈

咽喉方

治咽病深在咽下針刀不能及者

一名如神散

用膽礬細研以管子挑少許吹喉中即破續以白梅  
煎湯調炒殭蚕以去其風如無膽礬只透明綠礬代  
之一方醋磨口噙即時吐下立愈一方為末葦管吹

入一方為末摻入喉中為妙一方用綠礬研細米醋調嚥一邊痛則臥含嚥

治熱閉方

一名殊驗  
清中湯

治咽喉腫口舌生瘡解傷寒頭

痛凡腫毒之屬

用川升麻半兩剉井水濃煎少頃吐出毒氣一方用升麻四兩剉水四碗煎至一碗灌下

治熱閉喉

用蘿蔔汁和皂角漿吐之

葛根蔓方 治喉閉

用葛根蔓燒灰水服方寸匕

治喉閉壅塞不通方

用紅藍花搗絞取汁一小升服之以瘥為度如冬月  
無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉  
塞服之皆瘥

治喉閉纏喉風方及走馬喉痺

一名妙安散

用巴豆兩粒約連殼可通得入鼻用刀子切斷兩頭

穀子將針穿作孔子內鼻中久即瘥一方用綿裹內  
鼻中喉通即取出一方用七粒燈上燒存性綿裹含  
一粒即止如痺已死有餘氣者綿裹內入兩鼻孔約  
至眉間專把餘綿良久大喘勿怪吐則拔去之

治急喉閉遂巡不救者

以皂角去皮子生半兩為末每服少許以筋頭點腫  
處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破少血出即愈  
一方米醋煎服一方煖水一盞灌下或吐或下吐即

安

治喉痺方

用蟬螳蟲汁點喉中即喉開

治纏喉風又喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳方

用蠶退紙不計多少燒成灰存性煉蜜和丸如鷄豆  
大含化嚥津牙宣牙癰擦齦上口瘡乾傳患處小兒  
走馬疳入麝香少許貼患處佳

治喉痺咽喉疾喘息不通須臾欲絕者

一名聖石散

用絡石草二兩水一升半煎取一盞去滓細細喫須臾即可令通絡石草即石薺荔

治皮膚麻痺方

用莽草濃煎湯淋及治風虫牙喉痺亦濃煎汁含後淨漱口

治喉痺卒不語方

用豉煮汁一升服覆取汗亦可一方炒為末含之瘥一方用糯米二升揀去粳米入瓷盆內於端午前四十九

日以水冷浸之一日兩度換水輕以水淘轉逼去水  
勿令攪碎浸至端日取出令陰乾生絹袋盛掛通風  
旋取少許炒令焦黑研為末冷水調如膏藥並用藥  
貼項下及腫處一方生研糯米入蜜飲之

朴硝方

出肘後方

療喉痺神効

用硝一兩細細含嚥汁頃刻立瘥一方為末吹入喉  
中一方用盆硝以筆管吹入立愈

治纏喉風方

出海上名方



用雄黃一塊新汲水磨急灌吐下瘥一方加薄荷自然汁調下或吐或下

紫苑方

出衛生家寶方

治纏喉風喉閉飲食不通欲死者

用返魂草根莖即紫苑淨洗內入喉中待取惡涎出即瘥如患乳蛾刺破更以紫苑濃煎湯嚥下更以馬牙硝末挑一錢入喉間即愈一名紫苑又南中呼為牽牛是也

治喉痺

出肘後方

用皂莢礬石入好醋內或用醞醋亦妙以二物同研和嚥之立瘥此法甚奇如若喉痛偏在一邊即令病者側卧就痛處含之勿嚥皂莢礬石云即綠礬也

治喉痺方

出聖惠方

用半夏末方寸匕鷄子一枚去黃白盛淳苦酒令小滿內半夏末着中攪和鷄子內以罐子坐之於炭上煎藥成置杯中稍暖嚥之忌羊肉

治喉痺腫痛飲食不通

出肘後方

用黃蘗切片含之又黃蘗一斤呋咀酒一斗煮三沸去滓恣飲便愈一方搗傳腫上冷復易之用苦酒和

末佳

杏仁方

出肘後方

治喉痺

用杏仁煎熟杵丸如彈子大含嚥其汁或為末綿裹含之亦得

治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絕神驗方

用桑實根葉二兩水一升半煮取一盞去滓細細喫立通一方用根一握杵水絞取汁嚥之一方用根燒灰以燒桑枝瀝汁調下一錢

牛角散

出肘後方

治喉痺塞欲死者

用沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得治咽喉痺不語方

用獨根羊蹄草勿見風日及婦人鷄犬以三年醋和如泥生布拭喉令赤傳之

治馬喉痺并毒氣壅塞方

用桔梗二兩去蘆頭剉以水二大盞不計時候分溫  
三服

治患喉閉方

用鮫魚膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良  
久吐惡涎沫即愈一方取臘月青魚膽亦得

如聖丸

一名寬咽救生  
散出仁存方

治纏喉風一切喉痺危急及

走馬喉痺

用白殭蚕不拘多少直者新瓦上炒為末用生薑自然汁和丸如鷄豆大含化急者生薑汁調一錢竹筒子灌入喉中立効便吐出頑痰半食許再服再吐將大黃一片指大一分厚口含嚥半食間再換大黃含至三片皆愈若語不得神不清扶起坐灌藥從鼻入治急喉痺方

用油一合急灌之立愈若未瘥急解髮令散當頂心取方寸許急捉痛拔之少頃當通如更急則喉下當

咽管口炙一壯如麥粒大火至即瘥氣雖似絕但心  
下暖者亦可救此數法神驗

治喉痺方

用黃魚頰骨不計多少燒灰出火毒以茶清調下三  
錢

又方

出聖  
惠方

用鹽球千擣為末以赤糖為丸如彈子大含之

又方

用石蠟冷水磨飲之兼塗喉上瘡

射干湯

出肘後方

治喉痺

用射干細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入蜜少許旋旋服一方用一片含嚥津時時大開口吐氣頻拽兩耳

又方

用地黃汁二升蜜三升合微火煎之取二升稍稍含之



又方

用剝葫塞耳鼻孔日再易之有效

又方

用菖蒲根嚼燒秤鎰令赤內一杯酒中沸止飲之

青艾方

出海上方

用夏月青艾一束搗水服之痰涎即來神効冬月則用蛇床子以有嘴瓶盛猛火却以蛇床子置火中用紙封瓶口煙從嘴出以口含煙痰自出一方青艾和莖

葉一握用醋搗傳痺上冬月乾艾亦可

治喉痺法

用韭土中紅小蚯蚓數條用醋搗爛取汁與病人食并噙在喉內即時吐出痰血二三飯碗後飲食即進神効

治喉風

用天羅瓜研灌漱如無生瓜時用甘草一根穿入瓜內候乾取出研細為末沸湯灌漱

又方

出德生堂

治喉痺

用藏茹或糟茹切片令患者嚼數片鹹水嚥下喉中  
効如不可嚥絞汁灌下

治咽喉

用鍋底心墨細研紫蘇湯化下

治喉閉方

用白明礬飛過燈心草燒灰調和一處於猪膽內盛  
之懸於當風處乾之研細吹入喉中臘月製佳一方

無燈心一方用枯礬末摻喉內即愈

治堅鵝

用芥辣子一合研極細用好醢醋取汁濾淨用鷄毛蘸入喉內待喉內如雷響却用陳年麻骨燒烟吸入喉中立愈

救生丸

出經効濟世方

治纏喉風神効

用蚶蜊草又名皺面草細研用生蜜和丸彈子大噙化一二丸即瘥如無新者只用乾為末生蜜為丸不

必成彈子但如彈子大一塊此方有奇妙

治喉痺

出聖惠方

用地龍一條細研用白梅去核以裹之重着薄綿再裹令嚥津立効

又方

取麩鹽干搗羅為末以赤糖和丸如半棗大含嚥津一方治急喉閉腫

詩云急喉腫閉最堪憂只用承燈盞內油甚者不須

三五呷此方元是聖人留

奪命丹

出御藥院方

治大頭病兼治五種喉痺

詩曰人間治疫有仙方一兩薑蚕二大黃薑汁為丸  
彈子大井花調蜜便清涼一方為末生薑汁蜜水調  
服名五痺散

奪命丹 治纏喉風急喉閉牙關不能開重舌木舌雙  
乳蛾并誤吞竹木鷄魚骨刺並皆治之

白殭蠶

炒去絲用

寒水石

山豆根

紫河車

乾脰

脂管仲 縮砂仁 馬屁勃

各一兩

地粟沙

一兩

尾金星

一兩 另研半兩

右為末滴水為丸每藥一兩作十五丸蛤粉為衣每丸冷水半盞放藥在水中其藥俟畧有水泡起不用藥只服水半盞一丸可以救數人一方或用大青黛為衣

治喉痺邪氣惡毒入腹

川升麻 犀角 麝

治喉痺卒不得語方

用桂心如棗核大綿裹着舌須臾破之即瘥

咽喉舌諸方

爪耳下張口解開突處痛爪勿止兩三食久則得咽  
喉若已膿便潰

又方

隨所近左右刺手足指甲下令血出當先縛中指血  
聚後刺之皆須慎酒麪毒物



備急療急咽喉舌病者方

隨病所近左右以刀鋒裁刺手指大甲後爪中令出血即愈

又方

病卧急爪其蹠心隨所左右以瘡為度

治喉痺纏喉風

右用艾烟熏惡心自然破

又方

右用油頭髮用湯一盞洗汁喫惡心自破

治咽喉痺

用臘月猪尾燒末水服之

又方

含雞屎白良

又方

出肘後方

用巴豆去皮針線穿咽入牽出

又方

出聖惠方

用馬蘭子半升水二升煮取一升半服之

又方

煮桃皮汁三升服之

治喉閉及毒氣

出肘後方

以附子破作大片蜜塗炙令黃含嚥汁令盡更炙如前法  
治喉痺卒不得語

用商陸苦酒熬令濃熱傳之

含香法

出衛生寶鑑

治喉痺物鯁不可進食

含乳香一塊良久其物自化又面東丁字立熱水一

碗念吳水流順七遍便喫水立下

治急喉塞閉方

出衛生寶鑑方

露地蜂窠

燒灰

用竹筒吹入喉內或燒巴豆吸烟立効

又方

出衛生寶鑑方

大黃 鬱金 巴豆

去皮不去油另研

右等分為末每用一字薑汁調灌下如不能吞下即以鷺翎蘸藥掃喉中吐涎立愈

奪命散

出衛生寶鑑方

治喉風

膽礬

一兩另研

白殭蚕

一兩為末

烏龍尾

一兩另研

天南星

半兩為末

右和勻每用一字以鷄翎溫點藥掃喉中涎出再點藥入喉涎化為黃水出方用溫水漱口或用沙糖為丸含化亦得如鷄豆大

白礬散

出衛生寶鑑方

治纏喉風急喉痺

白礬

三錢巴豆分作六片

右用礬於鉢內熬化為水入巴豆在內候乾去巴豆

取礬研末以竹管吹入喉中立愈或是去巴豆用烏  
雞子清調礬灌入喉中

奪命湯 治喉風

每服用皂角三寸去黑皮并子入甘草二寸同打碎  
用水一盞煎至半盞去滓入蜜少許再煎三五沸放  
溫服連進二服立効且喫白粥一日忌麪油酒魚腥  
炙煨諸熱毒物一百日

治急喉閉并喉風

出海上方

白礬塊一

用刀頭煨服或銚內慢火熬化入巴豆肉七粒再熬數沸擦去巴豆為末角管收藏勿令氣走臨用時筆管挑藥吹入喉中即破

帳帶散 治急喉閉并喉風

用生白礬研為末冷水調下二錢余家嘗用之繫於帳帶上以備護急

朴硝散

選奇方

治喉痺

朴硝

細研 黃丹 飛過細研

右相拌和深粉紅色遇病用蘆管或筆管以半錢許

吹入喉中

解毒玉壺散

出衛生寶鑑方

治喉風喉閉及誤吞針錢竹刺

物及諸惡毒物無不療一藥醫數人之疾

白茯苓

管仲

礪砂

別研 馬勃 各二錢

紫河車

水煎

豆根

烏魚骨

金星鳳尾草

山藥

白朮

白殭蠶

蜜陀僧

各四錢

大甘草

一錢

寒水石

三錢

垺子



胭脂

錢一

乳香

別研四錢

麝香

別研半錢

象牙末

錢一

右各炒焙為末乳香麝香胭脂硼砂各研入衆藥末中用薄麵糊為丸如彈子大再用煨過軟石膏研為衣陰乾服將藥一丸水一盞浸一匙服時磨藥數遍飲之餘藥留再服

一匙散 治喉風

白殭蚕

兩一

荆芥

兩半

紫河車

錢三

五靈脂

分一

甘草

兩半

乾

柏葉

錢二

薄荷

錢三

右為細末每服一匙吹入喉中

治喉閉纏喉風百藥不效疾勢危甚死在須臾用此便甦再能生人

不蛀皂角兩挺以水大盞許攪濃汁濾去滓入生麻油攪勻每服一盞強令服之未吐再一服有病者先用它藥不效即急用此

一點雪 治喉閉喉腫

燄硝

三兩研細如粉

白礬

鎔飛一兩

右二味拌勻以一錢摻口中口噤不開者以半錢入於小竹筒內吹在鼻中如口內血出即用新水漱之忌熱麵

治喉閉

用生礬末吹喉中

治急喉閉開口不得者

右以黃蠟紙裹巴豆一箇如患人鼻孔大小中心切破急以塞鼻氣衝入喉中自破也已覺通利即除去

濠守王亞夫方巴豆殼拍碎破以綿裹隨左右納鼻中即吐出惡物後鼻中或小瘡亦無害

牙硝散 治喉痺及喉咽腫痛閉塞

白殭蠶

生去絲  
嘴五錢

馬牙硝

二錢

右同為末每服半錢生薑汁調下不以時候

又方

用白礬一錢薤磔內溶成汁入巴豆二粒再候礬枯豆焦為度作末蜜丸鷄豆大薑湯調服良久吐痰立

愈

治喉痛咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗

以馬蘭根二兩水一升半煮取一盞去滓細細喫立  
通

治喉痺

一方纏閉危急解髻令人拔頂中髮十二莖立通禿  
者撮其皮亦効一方青黛朴硝末吹入喉中又一方  
朴硝鷄子清調刷之

治鎖喉痺名朴蛇瘡項大腫痛連喉

蜈蚣赤足者

右研水下一二節或酒下愈

治朴蛇瘡

雄黃 白芷等分

右為末刷喉項內外仍飲之

又方

野苦馬汁

燈心

浸水良久  
撿其末

以和苦馬汁服之

又方

用白礬一兩巴豆去殼二十箇白礬入銚內滾數沸  
礬化開豆色黃黑頓冷去豆碾末用葦管吹入喉內  
即愈

治走馬喉痺

一法如左右喉痺於頂上分左右頭髮用挽拔之剥  
然有聲立效此法年幼時常見鄭六嫂救人甚多不

得其訣近與子正話及方得其法

治卒喉痺

用雞子一枚攪黃令相和吞下

又方

好升麻斷含之喉塞亦然

治痺已死有餘氣者

用巴豆一枚去皮心研碎分兩丸綿裹內兩鼻孔約至眉間垂出餘綿良久大喘勿恠吐則拔去之



治喉閉氣欲絕

用乾漆炒令煙筒吸之

絳雪散 治喉痺

硼砂

白礬

用皂子大一塊

馬牙硝

一分研

硝石

四兩

新巴豆

六枚黃丹

半兩

右麤薤小碗一箇先煨令熟下前四味次下黃丹次下巴豆仍將巴豆先打碎遂旋下候盡又下一箇入蛇蛻皮一條自然燒化成汁入桔梗末研勻每用少

許以筆管吹在患處

治喉痺方

元公章少卿說開德府士人携僕入京其一日忽患喉痺脹滿氣塞不通命在頃刻詢諸郡人云惟馬行街山水李家可着治即與之往李駭然曰證候危甚猶幸來用巴豆油紙作撚火着煙起吹滅之令僕張口刺入喉間俄吐出紫血半合即時氣寬能言及啖粥飲搽藥傳之立愈士人甚神其技後還鄉里村落

一醫偶傳得此術云咽喉病發於六腑如引手可探  
及刺破瘀血即已若發於五臟則受毒牢深手法藥  
力難到惟用紙撚為第一然不言所用之意後有拾  
得其方者蓋預以巴豆油塗紙故施火即着藉其毒  
氣直赴病處

又方

以皂角汁麻油灌未吐再服之

奪命丹 治纏喉風急喉閉牙關緊急不能開者重舌

單雙肉蛾并誤吞竹木鷄骨魚刺並皆治

白殭蚕

炒去絲嘴

山豆根

寒水石

煨

貫衆

縮砂仁

紫河車

乾胭脂

馬屁勃

八味各一兩

白茯苓

去皮

烏賊魚骨

磁石

三味各半兩

烏芋

一兩半俗名字薺

南硼砂

一錢象牙末

一錢

甘草

一兩

飛羅麴

三兩

麝香

一錢另研

金星

鳳尾草

一兩

右為細末滴水為丸每一兩可作一十五丸蛤粉為衣每服用冷水半盞放藥在內滾動候末起喫藥細

細呷之一丸救數人不拘時候

消毒丸 治喉痺口瘡腮頰腫痛

白僵蚕

炒去絲嘴

牛蒡子

微炒

右等分為細末煉蜜為丸每一兩作十五丸每服一丸食後含化

烏龍膏 治喉痺纏喉風

皂角

七挺搥碎水浸五升濾去滓

草烏頭

剉碎

天南星

剉碎

大黃

剉碎

三味各一兩

右件並入皂角水內煮至二升濾去滓不用再熬成膏子入新瓷器內盛候微凝入朴硝末一兩攪勻候冷入白殭蚕末一兩如前收之如患喉痺每一服半匙頭以甘草湯或茶清化下灌入口內立愈如藥乾以好酒少許潤之不拘時候

草麻散 合瘡口

草麻子

七枚 煇硝半錢

右為細末研成膏每用少許冷水灌漱去之

獨附散 治腑寒咽閉六脉微弱

附子

一枚切  
成片

右用蜜炙黃嚙甘味下須詳脉方可用

又方

白礬

一兩

右用入巴豆二十一粒搥碎去殼用煨礬枯去巴豆  
為末一字吹入喉中

防風立効散 治咽喉

柴胡 升麻 牛蒡子炒 全蝎 赤芍 石膏

生用 乾葛 甘草各一兩 北防風 鬱金 薄荷葉

半夏炮 赤茯苓 北細辛 川芎 羌活各半兩 桔

梗 荊芥各一兩

右麤末每服四大錢水一盞半葱頭一箇煎一盞食後臥時溫服滓再煎服忌酒毒物候發散後又相間

服局方解毒雄黃丸

湘中朱國學家合施此方往往輒效

治人挫喉氣不來



急以冷水灌之立効

一捻金散

鬱金

三錢

藜蘆

二錢

巴豆

一錢

炒

右為末喉腫及食刺熱茶點一錢骨鯁乾嘔喉風薄荷茶下

傳用神効方 療喉痺

桔梗

甘草

各一兩

右水一升煮服稍有膿出即消

治喉風

右以白礬末半錢鷄子清調灌入喉甚者宜巴豆肉  
針線穿嚥入喉牽出

治喉閉

右以巴豆十箇去殼將皮紙槌巴油在紙上將紙作  
大條子撚燈上燒着吹滅濃煙插入喉中得吐妙

治急喉痺

以礬石生含嚥津

治喉痺

以薄荷乾者為末水調服

又方

本草

以陳白朮煮服之

又方

以附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之

勿嚥甘汁

治喉痺

本草

以搗籐子燒灰研細為末酒調服一錢匕

利咽喉治喉痺

本草

取杏仁去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之

治喉痺

本草

以紫荊木煮汁服之

治纏喉風方

用白礬搗地龍以白礬為丸吞之痰出即愈

治喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦

取白蓑荷根絞汁服蟲立出

治喉痺

草犀根 千金藤

右二味等分咬咀煮汁服之

鬱金散 治喉閉腮腫痰結成核走馬纏喉諸風鬱  
者

鬱金 天南星 宣連

蝎已上各半兩 巴豆別研二錢半

右除巴豆餘為末入和勻壯者一錢老少者半錢生薑蜜水調下此藥乃微有毒須量人虛實加減服凡服此藥以瀉為度

凡治先以手搥腫破或即時再結愈甚或成宿疾不移時仍發如急喉閉未有藥先用漆筋二火燒令有烟含口中不得出氣候烟搶着發嗽即破然後用別藥又先飲生油令氣通後合他藥又巴豆一箇微煨過去皮用綿裹安耳或鼻中如瘡破即除去

又白殭蚕直者為末生薑自然汁調下一二錢大妙  
又桔梗甘草各一兩剉用水五盞煎數沸服有膿  
出即愈 又濃煮桂汁服一盞亦可桂末着舌下漸  
嚥之 又含鷄屎白 又含升麻 又急拔頂心髮  
數莖

治喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕

川根葉二兩水一升半煮取一盞去滓細細喫立通  
治喉痺及咽喉生瘡吞嚥不下

右用白礬一塊為末安住在鉄香匙上中間作一井  
入去殼好巴豆一粒同煮候礬乾巴豆熟碾成細末  
新汲水調下一字若未瘥再服

治喉痺

用白鸛脚骨及嘴煮汁服之或燒灰為末米飲服之  
又方

用海根以水磨服之

又方



用東向廁溺坑中青泥水調灌之効

治纏喉風咽中如束氣不通

用甜瓜蒂不限多少細研為末壯年一匙十五已下  
及老半匙早晨井花水調下一食時須含沙糖一塊  
良久涎如水出年深者涎盡有一塊如油布水上知  
盡矣涎盡食粥一兩日如吐多困甚即飲麝香湯一  
盞即止矣麝細研溫水調下此藥不大吐逆只出涎

水

甜瓜蒂採自然落者用水洗淨再以槓  
椰葉包裹於東牆有風處掛令吹乾用

導引法

出聖惠方

養生方云兩手拓兩頰手不動接時使急腰內亦然  
住定於兩肋頭向外拊搏腰氣散盡勢大悶如此來  
去七遍去喉痺

咽喉生癰

論

夫肺氣上通於喉嚨胃經外連於咽嗑其氣和平則呼  
吸嚥納無所妨碍若脾肺壅熱薰發上焦攻於咽喉結  
聚腫痛不得消散熱氣熾盛致結成癰妨碍吐納古方

論一寸為癰二寸至三寸為癰其候使人寒戰欬唾稠  
濁善用鍼者辨其可刺宜速破之仍施以點餌之劑  
喉嚨者呼吸之道路氣之所上下也懸癰為聲音之關  
臟腑有伏熱氣上衝咽喉氣血壅遏結於懸癰毒氣不  
散故腫痛妨悶甚者或長數寸隨喉出入不得食息宜  
急治之

方

天門冬煎 治纏喉咽嗑不利

生天門冬

升汁二

人參

一兩

生麥門冬

升汁二

生薑

升汁一

生地黃

升汁一

桂

去粗皮一兩

赤茯苓

去黑皮三兩

半夏

湯泡七遍

暴乾

一兩

甘草

炙三分

牛黃

研半兩

右除四味汁外餘六味先為末以天門冬麥門冬汁

煎減半次入生薑汁又煎減半次又入地黃汁并餘

六味同煎汁欲盡入白蜜一斤酥四兩同煎煎成甕

合盛不拘時溫水調下一匙以瘥為度

防風散 治喉癰及咽喉腫痛等證

防風

去義一兩

白附子

分三

地骨皮

半兩

麝香

研分三

丹砂

研

膩粉

研

白朮

馬牙硝

研

桂

去粗皮各一兩

赤茯苓

去黑皮一

兩

右為散每服半錢匕溫酒調下

治懸癰咽中生瘰肉舌腫

出聖惠方

用羊蹄草煮汁熱含令吐良

射干湯

治喉癰咽喉噎腫塞及心肺熱極吐納不利

射干

半兩

升麻

大黃

剉生用

惡實

生用各一兩

木通

剉三分

馬蘭子

炒半兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉七片煎七分去滓下馬牙硝半錢匕攪令勻不拘時細細溫服

治懸癰腫痛咽喉不利

出聖惠方

射干

半兩

木鱉子

一分

甘草

半兩炙

微赤剉

川大黃

一分剉

末微炒

升麻

一分

杏仁

半兩

湯浸去皮尖

雙仁麩炒微黃

右為末煉蜜為丸如彈子大含一丸嚥津

元參散

出聖惠方

治懸癰腫痛不下食

射干

大黃

各半兩

甘草

一分

元參

一分

升麻

半兩

右細末每服三錢水一盞煎至七分放溫時時嚥含

良驗

破毒妙方

出危氏方

白礬

巴豆

去殼

紅肉硝

草烏尖

猪牙皂角

薄荷

各三錢

右為細末好酸醋調鵝毛刷入口內勿吞仍以鹽湯

灌漱

治喉癰閉方

出直指方

白明礬

煨

牙硝

各一錢

胭脂

半錢

右研細爛烏梅肉丸旋含嚥

治懸癰乘熱暴腫脹痛咽中生息肉及舌腫方

一名乾姜湯出

聖惠方

乾薑

炮製剉

半夏

湯浸七遍去滑

右等分為末少少着舌上一方用鹽豉和塗所患處又先以開口鉄針刺破血出後用藥少許塗之神効



若痒時以生薑汁解之

喉中懸癰垂長咽中妨悶

出聖惠方

用燒鹽末枯礬末各一兩相和以筋頭點之即消

啓閉散 治風熱客搏上焦懸癰腫痛

惡實

炒

甘草

生各一兩

右為散每服二錢匕水二盞煎六分旋含之良久嚥下

馬牙硝散

出聖惠方

治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通

用馬牙硝半兩細研為散每服一錢綿裏含嚥津以通為度

又方

用童子小便四五歲者一合并銅錢二文含一方用鹽不用錢

治懸癰腫痛咽喉不利胃中煩熱宜服此方

出聖惠方

射干

一兩

元參

半兩

川升麻

半兩

白礬

半兩

白藥

半兩

黃蘗

半兩

兩

天竺黃

一兩

犀角屑

半兩

白馬牙硝

一兩

甘草

半兩

炙剉

兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三百杵丸如小彈子大不計時候以綿裹一丸含嚥津

犀角散

出聖惠方

治咽喉中生癰瘡腫痛

犀角屑

兩一

元參

三分

黃耆

剉一兩

黃芩

三分

絡石

三分

販醬

三分

白欬

分三

川大黃

一兩剉

甘草

半兩炙

微赤剉

右為散每服三錢水一鍾煎至六分去滓入川朴硝

一錢攪令勻不計時候服

治咽喉卒生癰腫飲食不通方

出聖惠方

用燒秤錘令赤內一盞醋中令沸止飲之一方用酒  
治懸癰腫長數寸隨喉出入不得食方

令病人大開口以筋按舌下燒小烙鐵於竹管中烙  
即愈少根不盡漸更烙之即以鹽塗烙處

硼砂散

出聖惠方

治懸癰腫痛

硼砂

別研

馬牙硝

枯

滑石

寒水石

已上各

二錢

腦子

別研

錢一  
白礬

枯一

錢半

右研令極細每服半錢新汲水調下不拘時候

鉛霜散

出聖惠方

治懸癰腫脹疼痛

鉛霜

一分甘草

一分半生半熟搗羅為末

右都研為散每服以綿裹半錢含嚥津瘡

治懸癰咽中生息肉舌腫方

日初出向日張口使婦人用布裙圍住其頭上七下

瘡

治喉内生癰

出經驗良方

五倍子為末入白殭蚕甘草少許用白梅肉為丸噙

化其癰自破

治喉癰卒腫方

出聖惠方

用薏苡仁吞二枚即瘥一方用一兩水一大盞煎至五分去滓頻服之

治懸癰腫

出聖惠方

用硼砂二錢綿裹含嚥津瘥

帝鍾風即喉間帝鍾長腫有長數寸者

出聖惠方

用食鹽煨過鴉毛蘸下即消不須針破破則傷人綿

裹筋頭鹽指日六七度易

名雪花散

聖煙散 治懸癰腫脹喉閉塞急令開口看有蛾無蛾  
若有蛾須是針破方可若望不見以草麻子打碎用  
紙捲作筒一頭燒煙起竟以煙熏咽喉內自然可破  
纔望見即以三稜針刺破出紫血半盞許便愈其有  
貴宦之家不容用針者則惑之曰用筆蘸藥先以針  
安筆心內刺之一方用巴豆依前法燒熏或只以草  
麻子巴豆二藥榨油在紙上作紙撚子燒用

治咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅

子臭氣自出遂退食飲

出傳信  
適用方

用臭橘葉煎湯連服愈

油膏 治咽喉生癰藥不下及喉閉等證

生麻油

半斤按皂角拾挺  
用生絹濾去滓

右灌此麻油即瘡穿膿血吐出而愈

治喉癰方

楊立之自廣府通判歸楚州喉間生癰既腫潰而膿



血流注曉夕不止寢食俱廢醫者束手適楊吉老來  
赴郡守招立之令子徃邀之至熟視良久曰不須看  
脉已得之矣然此疾甚異須先啖生薑片一斤乃可  
投藥否則無法也語畢即出子有難色曰喉中潰膿  
痛楚豈宜食生薑立之曰吉老醫術通神其言不妄  
試取一斤我啖如不能進則屏去無害遂食之殊為  
甘香稍復加益至半斤許痛處已寬滿一斤始覺味  
辛辣膿血頓盡粥餌入口了無滯碍明日招吉老謝

而問之對曰君居南方多食鷓鴣此禽好啖半夏久而毒發故以薑制之今病源已清無服他藥予記唐小說載崔魏公暴亡醫梁新診之曰中食毒僕曰常好食竹鷄梁曰竹鷄多食半夏苗蓋其毒也命捩生薑汁折齒灌之遂復活正與此說相同

治喉痛方

以山豆根常常含嚥津

治肉鵝喉痺

用白礬半兩飛過者入半碗沸湯調通口服之血胞  
隨手自消若經少時變作血膿難醫

半夏厚朴湯 治陰灸內癰

半夏三兩厚朴三兩茯苓四兩紫蘇葉二兩

右為細末每服五錢水二盞薑五片煎一盞去滓服  
雄黃散 治咽漏瘡初生結喉上如癰腫破後有眼子

雄黃 蜜陀僧各一錢膩粉三錢麝香一字

右研細末未破用白梅湯調塗已破挹去膿汁乾貼

破毒丹 治單雙雕

右以巴豆一枚紙裹火內炮令驚破聲為度去紙揭起頭皮些子左雕於右鼻內着右雕於左鼻內着雙雕則着兩頭即時響破膿血下也

白丁香丸 治咽喉雙雕及單雕

用白丁香二十箇

家雀屎是也

以沙糖如胡桃大一塊同

和研分作二丸每一丸用薄綿子裹令含在口內即時遂愈甚不過兩粒也此極有奇功

治卒喉中生肉

以綿裹筋頭柱鹽指日六七度易

咽喉生瘡論

夫咽喉生瘡或白或赤痰唾稠濁喉中腥臭疼痛此蓋上焦有熱脾肺不和熱搏其經致熏發咽喉故也

方

半夏湯 治咽喉生瘡嗽唾如鯁語聲不出

半夏

湯浸去滑  
七遍二兩

射干

乾薑

炮

杏仁

湯浸去皮  
尖双仁炒紫

苑去苗麻黃

去節煎掠去沫焙

吳茱萸

湯洗焙乾炒

桂去粗皮

陳橘

皮

湯浸去白焙

獨活

去蘆頭一兩

當歸

切焙一兩

右麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服  
初痛一二日可發汗病久者可加大黃一兩半初秋  
夏月暴冷利及天行暴熱喜怒伏於內宜加生薑二  
兩乾姜茱萸枳實各一兩修製如前法

黃耆散

出聖惠方

治咽喉內生瘡疼痛

黃耆

半兩剉

甘草

半兩生剉

梔子仁

半兩

黃芩

三分

元參

一兩赤

茯苓

半兩

檳榔

半兩

川升麻

三分

紫苑

半兩

洗

麥門冬

去心

焙一兩

牛蒡子

半兩

右為散每服二錢以水一鍾煎至六分去滓不計時

候溫服之

治喉中有瘡唾血不下食宜服此方

出聖惠方

黃耆

一兩

露蜂房

半兩

薔薇根

一兩

絡石

一兩

射干

一兩 羚羊角屑

半兩

甘草

半兩

川大黃

一兩

碎

微炒

元參

半兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候  
溫服

普濟方卷六十一



欽定四庫全書

普濟方卷六十二

明 周王朱櫚 撰

咽喉門

咽喉生癰

療喉中及舌生瘡爛方

用剉薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉

酣飲喉舌生瘡方

出朱氏  
集驗方

治連月飲酒咽喉爛舌生

瘡

用水中螺蚌肉用葱豉薑椒煮汁飲三兩盡瘥

療喉中口及舌生瘡爛方

用黃連一兩切水三升煮取一升稍稍含冷吐忌猪

肉生冷

黃芪湯 治咽喉疼痛生瘡

黃耆

炙劉

甘草

炙

麥門冬

去心焙

山梔子仁

各半

黃芩

去黑心

赤茯苓

去黑皮

人參

檳榔

煨劉

貝母

去黑心

炒

紫

苑

去首各

一分

右粗搗篩每服一錢匕水一盞煎至六分去滓溫服  
食後日三

去毒玫瑰丸 治上焦有熱咽喉生瘡赤根白頭痰唾  
稠濁口中腥臭化涎生津

五倍子 紅雪

研各一兩

馬勃

升麻

礬蛭蝶

研 礬

砂

研各半兩

丹砂

研

麝香

研

龍腦

研各一分

甘草

生用三分

右為細末糯米和丸如鷄頭實大每一丸含化不計

時候

犀角散

生犀角屑

玄參

去蘆

升麻

生黃耆

去蘆切

麥門冬

去心生粉草

當歸

酒浸去蘆焙各一兩

大黃

微炒二兩

赤芍藥

一兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

無時候

龍膽煎 治喉腫瘡并口瘡

龍膽黃連

去鬚

升麻

去土

黃蘗

去皮蜜炒

苦竹葉

切

槐白

皮大青

各一兩

酥

半合

白蜜

半合

右細剉七味如麻豆以水三升半煮取七合絞去滓  
內蜜及酥再煎五六沸每服一匙頭含化嚥津日可

### 五六服瘥

桃紅散

出王氏  
傳濟方

治喉中生瘡腫赤紫色者咽噎痛嚥

### 物有妨

金箔

十片

銀箔

十片

丹砂

研

馬牙硝

研

甘草

炙搗末  
各一兩

鉛

白霜

研少許

凝水石

四兩

太陰玄精石

二兩二味搗碎  
入一合子內煨

令通赤取出黃  
土內埋一宿

右研每服一字甘草調下如要丸以稀糯米粥和為丸如豌豆大含化燕津

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌

真琥珀

研

生犀角屑

各一錢重

辰砂

研

茯神

去木各二錢并去皮

真腦子

研一字

人參

去蘆

酸棗仁

去皮研二錢

右人參茯神犀角為細末入乳鉢內別研藥味和勻用煉蜜搜為膏子以甕瓶收貯候其疾作每服一彈子大以麥門冬去心濃煎湯化服一日連進五服取

効

利膈湯 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

鷄蘇葉 防風 荊芥穗 桔梗 人參 牛蒡

子

隔紙炒

甘草

各一兩

右為末每服二錢沸湯點服如咽喉口瘡甚者加殭蠶一兩

地黃湯 治咽喉中生瘡唾血不下食

生地黃

細切一兩半

竹茹

玄參

鷄蘇苗

各一兩

赤茯苓

去黑升麻 麥門冬 去心焙各  
皮 一兩半

右除地黃外粗搗篩入地黃拌勻每服三錢匕以水  
一盞煎至五分去滓溫服食後臨卧如不能多服細  
細嚥含

白藥丸 治喉中有瘡欬嗽

白藥子 玄參 射干 甘草 炙 桔梗 炒各  
半兩

右搗羅為末煉蜜為丸如彈子大綿裹含化嚥津

牛黃金露丸 治風壅毒氣上攻咽喉舌頰腫痛生瘡



噎悶化涎解燥

牛黃

研

龍腦

研各一錢

人參末

二兩

甘草

生為末半兩

甜硝

研半

兩

丹砂

研水飛一兩

右研細以軟糯米飯為丸如鷄頭實大每服一丸含

化嚥津

救命散 治脾胃熱上攻心肺咽喉有瘡并纏喉風

大黃

劉連

去鬚

白僵蠶

直者炒

甘草

生各半兩

膩粉

三錢匕

五倍子

一分

右為細散每服一匙大用以竹筒子吹吸小兒以竹筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用孩兒妳汁調藥一匙以雞翎探之嘔生不嘔者死

治咽喉瘡腫雙乳鵝喉疳熱毒方

龍腦

一字

薄荷葉

五錢

大黃

生二錢半

甘草

一錢

盆硝

半錢

蒲

黃

生用淨者一錢

右為細末每服少許吹咽喉內噙化忌生葱蒜薑胡

椒

乾地黃散

出聖惠方

治咽喉内生瘡唾血不下食宜服

生乾地黃

一兩半

雞蘇苗

一兩

赤茯苓

一兩

麥門冬

一兩半去

心焙

玄參

一兩半

甘草

半兩生剉

右為散每服三錢水一盞入竹茹一分煎至六分去

滓不計時候溫服

治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛宜服此方

出聖惠方

牛蒡子

一兩微炒

乾浮萍草

半兩

川升麻

半兩

玄參

半兩

黃蘗

半兩剉

甘草

半兩生剉

右為末煉蜜和丸如彈子大含一九嚥津

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏

當歸

射干

升麻

各一兩

附子

半兩

白蜜

四兩

右咬咀以猪脂四兩先煎鎔成膏下着地勿令大熱  
內諸藥微火煎令附子色黃藥成絞去滓內蜜復上  
火一兩沸令相得置器中令凝取如杏仁大含之  
四五遍輒嚥之

小礪砂散 治咽喉腫生瘡疼痛

礪砂 馬牙硝

各三錢

桔梗

甘草

薄荷

各一兩

右為細末乾摻咽中

薔薇根引

治喉咽生瘡連舌頰痛不可忍者

薔薇根皮

一兩

升麻

三分

生乾地黄

黃蘗

各半兩

鉛白

霜

研一錢

右搗羅為末入鉛霜研勻每服二錢匕水一盞入蜜半匙煎至七分稍通口熱漱咽噉吐之即令及時用藥末摻瘡上

升麻湯 治咽喉生瘡

升麻

剉

甘草

炙

石膏

研

牡丹皮

各一兩

右麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓不拘時候細細溫服

黃連湯 治喉中生瘡久患疾勞不下食日漸羸瘦

黃連

去鬚半兩

豉

半兩切曰

薤白

半斤

猪膽

右先以童子小便八合煎黃連豉薤白取四合去滓下猪膽煎至三合空腹頓服每隔日依法再服

治咽喉内生瘡疼痛依用此方

一名黃丹煎  
出聖惠方

龍腦

二錢  
細研

蜜

八錢

黃丹

二兩

麝香

二錢  
細研

右先於銀鍋內化蜜用綿濾過再於鍋中以慢火煎次下黃丹煎成膏候冷熱得所內龍腦射香攪勻入於磁盒中盛每服一九如杏仁大綿裹含嚥津

杏仁丸

一名口瘡煎

治咽喉及舌生瘡爛

杏仁

湯浸去皮尖  
雙仁半兩研

黃連

去鬚  
為末

甘草

炙為末  
各一分

右麝研和勻綿裹如棗大含之瘡一方以蜜丸

療口中塞及咽喉不利生瘡口燥膏方

猪膏一斤白蜜一斤黃連一斤

右合煎去滓冷攪相得含如半棗日四五度

麥門冬丸 治虛熱上攻脾肺有熱咽喉生瘡

麥門冬一斤黃連一斤

半兩

右為末用蜜丸如梧桐子大每服三十九門冬湯下

食前

千金地黃丸 治證同前



黃連

四兩末

生地黄

半斤取汁和連日乾

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十九門冬湯下以

地黃汁為丸亦可

合口瘡方

出危氏方

滑石

黃丹

各等分

右為末點瘡効仍用黃耆一兩二錢甘草一兩二錢

為散煎服妙

治喉中瘡腫方

出肘後方

蒲州膽礬

一錢 葱鬚 陰炙者 二錢

右為末研勻一字入竹管內吹病處

治咽中瘡腫方

永類 鈴方

草麻子

一枚 去皮 朴硝 一錢

右同研新汲水作一服連進二三服効

治咽喉及舌生瘡爛方

白礬

熬冷汁 盡二兩

黃連

去鬚 一分

右為末每服一錢匕綿裹含化嚥津瘥

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡

大麻仁

一升黃蘗二兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一粒含化

咽喉生瘡冷閉聲不出者

出危氏方

秘傳降氣湯去陳皮加黃芩煎仍於喉下咽管口灸

三壯即愈

硼砂散

出御藥院方

治心脾風毒熱所發咽喉生瘡腫疼

痛或子舌脹或木舌脹舌腫至腫悶塞水漿不下

南玄參 貫衆 白茯苓去皮 縮砂仁 滑石研 荊

芥穗 甘草生用 山豆根 青黛研各半兩 礞砂研三兩 蒲

黃 薄荷葉各一兩 寒水石燒過研三兩半

右為細末入研藥每服半錢新汲水調下或諸舌脹  
摻在舌上嚥津無妨不計時候

龍腦散出仁存方 治咽喉腫頰舌生瘡

朴硝一兩 甘草 龍腦 薄荷各半兩

右為末咽中生瘡竹筒吹入口瘡用井花水調漱

膽礬散 點瘡

膽礬

一錢  
飛過

硃硝

二錢

右為細末點腫處立穿穿則用合瘡口藥

南星散 搽藥

絳礬

煨

牙硝

飛

南星

薄荷

右各兩多少為細末水溫手點藥腫搽重處須用力  
搽之至痛無害然後服藥

半夏塗藥

半夏 南星 白殭蠶

右各用一錢用巴豆七粒去皮油合前藥細研用少許生薑自然汁調塗外面腫處

咽喉生瘡

取杏仁去皮炒令赤和桂末研如泥綿裹如指頭大含之

治喉中及口舌生瘡爛

用酒漬蓂荷根半日含漱其汁瘥

治喉腫瘡方

出千  
金翼

含荊瀝稍稍嚥之

尸咽喉

夫道家服藥務先去三蟲者以其為人害也尸咽之病一本於此腹中蟲上蝕咽喉能令生瘡或痛如痒如蠶之候者是也善攝生者倘未能除去亦當服藥治之勿使妄動則善矣

方

黃蘗湯 治尸咽喉閉塞出瘡及乾嘔頭痛食不下

黃蘗

去粗皮  
炙半兩

升麻

木通

剉各  
一兩

竹茹

三分

麥門冬

去心

焙一兩半

玄參

一兩

前胡

去蘆頭

大青

各三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入芒硝末一錢攪令勻溫服如鼻中有瘡以地黃汁少許滴於鼻中三五服不計時候要通利加芒硝不欲利去之

金露丸 治尸咽喉風熱毒氣上攻咽中痒痛



硃砂

錢一

白礬

生用一分

甘草

半兩搗羅為末

鉛霜

錢一

射香

錢一

太

陰玄精

一分

蛇蛻皮

三條全者去頭以皂莢水浸一時復曝乾炒黃

右都研令勻煉蜜和丸如莢子大每於食後及夜卧

時用薄綿裹一丸含化嚥津

治尸咽喉痒痛語聲不出宜服此方

五倍子

半兩

黃蘗

半兩剉

川升麻

三分

甘草

一分炙微赤剉

射干

半兩

右為散每服三錢水一盞煎至四分去滓不計時候

溫服

蛇蛻散 治咽喉疼痛

蛇蛻皮

白梅肉

甘草

生用各一分

惡實

半兩炒

右為散每用綿裹一錢匕湯浸潤含化嚥津不計時  
候服

治尸咽喉痛方

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

桂

去粗皮各二兩

蕪荑仁

一兩

樞實

去皮半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大含化嚥津消盡再用日

二三服

一捻金散 治尸咽喉及走馬喉閉或腦内生癰

雄黃

研

藜蘆 猪牙皂角

去皮并子  
各一兩

右為散先含水一口用藥一米許搐鼻內即吐出水  
少時効

杏仁散 治尸咽喉內痛欲失聲

杏仁

湯浸去皮  
尖雙炒

桂

去粗皮  
各二兩

蕪荑仁

炒一兩

右為散每服三錢匕綿裹含化嚥津消盡再用日三

五服

治尸咽喉痒痛

射干

一兩

薔薇根皮

一兩

甘草

半兩

炙微赤

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候

溫服

治尸咽方

用燒履鼻繩為灰暖水服之

治咽喉中痛痒吐之不出嚥之不下似得蠱毒方

用生薑含口中自差

又方

用青布裹麻黃燒筒盛烟吹喉中

治尸咽方

用燒麻子脂服之

治飛尸遊蠱中有物含吞不出方

用蚘蛇肉作膾食之

狗咽論

夫狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風毒熱氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾由誤燕毛而致其治法亦有將飯與狗分食取瘥者禳去之法也

方

昆布丸 治咽喉中壅悶氣塞不通狀如喉痺者

昆布

洗去鹹味一兩

訶梨勒皮

二兩

檳榔

剉一兩

松蘿

乾薑

炮製剉

桂

去粗皮各一兩

海藻

洗去鹹味一兩

木通

剉二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服酒溫下二十九  
食後臨卧服

馬牙硝煎 治狗咽氣塞腫痛氣欲絕者

馬牙硝 木通剉 升麻 瞿麥穗 犀角屑 馬

蘭子

各一兩半

射干

玄參

各一兩

右細剉以水五盞煎至一盞半去滓下白蜜二兩再  
煎成膏每服一匙頭含化嚥津

玄參散 治狗咽氣塞

玄參 杏仁

湯浸去皮  
尖雙仁炒

甘草

炙  
赤茯苓

去黑皮

白朮

桔梗

炒

人參

各半兩

右為散每服二錢匕熱湯調下日三五服

丹砂酒 治狗咽喉中忽覺結塞

丹砂 桂

去粗皮

絳礬

各半錢

右為末綿裏用好酒浸良久含之即瘥

二灰散 治狗咽纏喉風

燈心燒灰

炭上白灰

白殭蠶

直者炒  
各等分



右同研為散生薑蜜水調下一錢匕

如聖散 治狗咽及咽喉緊急

赤芍藥

一錢半  
兩 防風

去叉  
三分

天麻

半兩

右為散每服一錢冷茶調下不拘時候

石膽散 治纏喉風及狗咽

石膽

一錢半  
燒研

白芷

一錢  
為末

右研勻細每服半錢匕溫漿水調下取出涎後再一

兩服瘥

雞子法 治狗咽

半夏

一錢末薑汁搜為餅子焙乾細研

雞子

一枚

右先開雞子頭去黃又盛苦酒入半夏末殼中攪令勻安雞子坐於搪灰火中慢煎沸熟取出後稍冷就殼帶溫三服之

治狗咽喉方

用粟米三合以手團為一塊與狗分食之即愈

治咽喉忽覺氣塞喘息不通須臾欲絕方

用獨顆蒜一枚削去兩頭可塞鼻竅患左塞右鼻患  
右塞左鼻喉口中濃血出立効

惡實散 治風熱閉塞咽喉腫結

用惡實一合半生半炒搗羅為散酒調下一錢匕立  
瘥一方取生莖葉研塗上喉兼推一莖令頭破內喉  
又方

用生鼠粘子用末沙糖為丸噉化又用根切一升以  
水五升煮取三升去滓分溫三四服忌蒜麪

如聖丸

一名如聖散

治喉中忽然結塞不通

方見口舌咽喉門喉痺類

黃白散

治狗咽

芒硝

研一兩

硫黃

研一兩

右先將芒硝於銚子內熬令沸澄清下硫黃末於銚子內攪令煖出即傾在新碗內放冷細研如粉每服半錢匕新汲水調下

咽喉生穀賊論

夫喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此由

禾中有短穗偶誤食之澁搏咽喉如魚鯁不上不下風熱加之則結腫不消若不急療亦能殺人

方

象牙散 治咽喉中生穀賊如鯁狀不上不下疼痛妨

悶

象牙

末一分

甘草

大者一寸

滑石

半分

菴豆粉

二兩

鬱金

小者一塊

乳香

研

硼砂

研

射香

研各半兩

右為散每服半錢匕新汲水調下

五味子湯

治咽喉腫生穀賊結腫疼痛妨害飲食

五味子

炒一兩半

乾薑

炮

麥門冬

去心焙

桂

去粗皮各一兩

桑白

皮

剉炒三兩

粳米

炒一合

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服

日三不計時候

射干湯 治咽喉生穀賊噤食妨悶

射干

升麻

各三分

桔梗

微炒一兩

玄參

木通

剉各三分

甘

草

炙剉各半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食後溫服如要通利加大黃一兩以利為度

治咽喉生穀賊腫痛方

出聖惠方

重臺

半兩赤色者

木鱉子仁

半兩

川大黃

半兩剉碎微炒

馬牙硝

半兩半夏

一分湯浸洗七遍去滑

右為末煉蜜和丸如櫻桃大以綿裹一丸含嚥津

乳香丸 治喉中生穀賊若不為急治亦可以殺人

出聖

惠方

乳香

半分

硃砂

一分

琥珀

脂松

半兩

右各研為末再同和勻鎔白蠟為丸如雞頭大每服  
一九含嚥津以差為度

茯苓散 治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶

赤茯苓 貫衆 縮砂仁 甘草

炙等分

右為細末乾摻一錢喉中次以水送下

治穀賊方

出直指方

硼砂 牙硝

等分



右細研每服半錢以薄綿裹含嚥

麻仁散

出三因方

治穀賊尸咽喉中痒此因誤吞穀芒搶

刺痒痛

用芝麻炒不拘多少為末湯點服凡穀賊屬咽馬喉風屬喉不可不分

治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫嚥物妨悶疼痛及咽喉中傍痛

用礬石生研為末少少傅腫處以差為度有涎即吐

之一方用綿裹含嚥津如傍痛側卧就痛處含之勿

嚥

又方

出聖惠方

用鍼刺破令黑血出後含馬牙硝一小塊嚥津即差

一方用綿裹半錢匕含

升麻湯

一名黃藥湯

治咽喉生穀賊嚥物妨悶

方見本門尸咽喉類

穀賊方

出直指方

木鱉子仁 川大黃焙 牙硝 射干 山豆根

川升麻 白藥

各等分

右為末煉蜜丸如皂子大以薄綿裹含嚥液

如神丸

一名如聖丸

治喉中忽然結塞不通

方見本門喉痺類

咽喉中如有物妨悶論

夫咽者胃之系故咽主嚥物夫氣通於肺故喉主通氣  
咽喉中妨悶如有物乃肺胃壅滯風熱客搏結於咽喉  
使然故聖惠以憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾

方

防風散

出聖濟總錄

治咽喉中如有物妨悶噎塞胸膈痰

滯

防風

去

人參

白朮

獨活

去蘆頭

草豆蔻

去皮各三分

天麻

芫蕒

白芷

赤茯苓

去黑皮各一兩

細辛

去苗葉

高良姜

青橘皮

甘草

炙各半兩

京三稜

炮製半兩

厚朴

去粗皮薑

汁炒三錢

右為散每服三錢匕酒調下棗湯亦得日三不拘時

候

杏仁煎 治肺胃壅滯咽喉中如有物妨悶

杏仁

湯浸去皮尖  
雙仁炒黃

桑根白皮

剉炒

貝母

去心各  
一兩半

生薑

汁一  
合半

地黃

汁二  
合半

酥

兩半

大棗

六十枚  
去核

紫苑

去苗  
三分

甘草

炙

桔梗

炒

五味子

炒

赤茯苓

去黑  
皮

地骨皮

各一  
兩

參

三分

右先研杏仁以水五升濾去汁將草藥細剉同煎至  
二升以綿濾去滓續下酥及地黃汁慢火煎成膏每  
食後含一匙頭細細嚥津

射干散

出聖惠方

治咽喉中有物妨悶噎塞疼痛悶亂嘔

物不下

射干 犀角屑 川升麻 桔梗

各三分

訶梨勒皮

紫蘇子

炒

赤茯苓

枳殼

麩炒去穢

檳榔

各一兩

甘草

炙赤劉

木通

劉

木香

各一兩

右為麤末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不

計時候

木香湯

出聖濟總錄

治咽喉噎滯如有物妨悶

木香

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去粗皮生薑汁炙

半夏

生薑汁浸

一宿湯洗七遍切焙

白朮

甘草

炙

桂

去粗皮

大腹皮

各二兩

黃

耆

劉

人參

桔梗

炒

芍藥

各三兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓食後熱服日三

半夏湯

出聖濟總錄

治咽喉中如有物妨悶

半夏

湯洗七遍切焙一兩

人參

甘草

炙

栝蒌根

劉

桂

去粗皮各

三兩  
兩小麥

吳茱萸

湯洗焙乾各一兩半

赤小豆

一分

右劉如麻豆大每服五錢匕水一盞入生薑三片棗二枚劈破同煎至八分去滓溫服

射干散

出聖惠方

治咽喉中如有物噎塞

射干

一兩 桂心

一兩 枳殼

三分 半夏

一分湯洗

七遍去滓

訶梨勒

皮

二兩 川升麻

一兩 木通

一兩 前胡

三分

去 大腹皮

蘆頭

劉 三分

右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服



含化龍腦丸

出聖惠方

治咽喉中有物如彈丸日數深遠

難嚥津發渴疼痛即須針腫結處散盡毒氣

龍腦

一分細研

川升麻

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

黃耆

一兩剉

馬牙

硝麝香

一分細研

鍾乳粉

一兩

川大黃

半兩剉碎微炒

生地黄

五兩取汁

右為末入研了藥研令勻以地黃汁相和更入煉了蜜和丸如楝子大不計時候以綿裹一九含嚥以咽喉通利為度

人參湯

出聖濟總錄

治咽喉如有物噎塞

人參

甘草

炙

訶梨勒皮

各一兩

麝香

去毛

陳橘皮

湯浸

去白皮焙

桂

去粗皮

烏梅

去核各半兩

陳麴

炒三分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服

不計時候

羚羊角湯

出聖濟總錄

治咽喉如有物妨悶食即噎塞不

下

羚羊角屑

赤茯苓

去黑皮

半夏

湯洗七遍去滑炒

木通

剉

射干

各半兩

倉粟米

炒二合

桔梗

炒一分

蘆根

剉一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三

竹皮湯 治咽喉中如有物噎塞聲氣不出

竹皮

甘草

炙各一兩

人參

赤茯苓

去黑皮

桂

去粗皮

麻

黃

去根節先煎掠去沫焙

五味子

木通

剉各三分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑汁半分拍碎煎取六分去滓放溫不計時候日三

木香散

出聖惠方

治咽喉中如有物噎塞不通吞不能入

吐不能出

木香

半兩

犀角屑

一兩

玄參

半兩

羚羊角屑

一兩

桑根白

皮

一兩半

川升麻

一兩半

紫雪

一兩

射干

一兩

檳榔

一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候

溫服

射干湯

出聖濟總錄

治咽喉中如有物噎塞不下

射干

升麻

紫苑

去苗土

百合

各半兩

木通

剉一兩

桔

梗炒赤茯苓

去黑皮  
各三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後  
溫服如要通利每服加朴硝末一錢匕去滓後入攪

勻服

黃芩射干湯 治咽喉如有物噎塞

黃芩

去黑心

射干

各一兩

枳殼

去穰  
麤炒

半夏

湯洗七遍  
去滑焙

甘

草

炙劉各  
三分

升麻

一兩  
半

桂

去粗皮一  
兩一分

右搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至

八分溫服日三

絡石湯 治咽喉中如有物噎塞

絡石

紫苑

去苗土  
各半兩

升麻

射干

各三分

桔梗

炒木

通

劉

赤茯苓

去黑皮  
各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食  
後溫服如要通利即湯成加芒硝末一錢匕攪勻服  
之

黃耆甘草湯 治咽喉似有物噎胸中滿脇下氣上衝

飲食減少

黃耆

甘草

炙各一兩半

桂

去粗皮半兩

人參

一兩

芍藥

赤

茯苓

去黑皮各二兩

右咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片大棗二枚去核同煎至八分去滓內飴糖少許煎化熱服良久以稀粥投之

訶梨勒散 治咽喉中有物妨悶噎塞不下食

訶梨勒皮

三分人參

半兩去蘆頭

桂心

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

檳

榔半兩陳橘皮

半兩湯浸去白穰麴焙

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候服之

半夏散 治咽喉中如有炙腐

半夏

一兩半湯洗七遍去滑

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙香熟

赤茯苓

一兩

紫蘇葉

一兩

訶梨勒皮

一兩半

枳殼

一兩麴炒微黃去穰

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服



半夏木通湯 治咽喉如有物噎塞飲食妨悶

半夏

湯洗七遍  
去滑焙

木通

剉  
炒乾薑  
炮各  
半兩

芍藥 桑根白

皮

炙各  
半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入鹽少許煎至六分  
去滓服一方搗為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十  
五丸食後生薑湯漸加至二十丸

麥門冬湯

出聖濟  
總錄

治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶

麥門冬

去心焙  
三兩

半夏

湯洗七  
遍焙乾

人參

甘草

炙各  
一兩 倉

粳米

炒一合

右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入棗一枚劈破煎至五分去滓溫服日三不計時候

桔梗湯

出御醫院方

治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗

二兩剉

人參

去蘆頭

甘草

炙剉各半兩

半夏

湯洗七遍切焙一兩

右粗搗篩每服三錢加至五錢匕水一大盞入生薑五片同煎至六分去滓溫服食後臨卧

人參丸

出聖濟總錄

治咽喉如有物妨塞氣噎飲食不下

人參

一兩 去粗皮

甘草

炙

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後生

薑湯漸加至三十九日再

四味湯

出聖濟總錄

治咽喉中如有物嚥吐不利

半夏

生薑汁溫一宿湯洗切焙

厚朴

去粗皮生薑汁炙

陳橘皮

湯浸去白焙各

一兩 赤茯苓

去黑皮二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入薑一塊拍碎煎至

六分去滓食後溫服

厚朴湯

出聖濟總錄

治咽喉有物

厚朴

去粗皮生薑汁炙

赤茯苓

去粗皮各二兩

半夏

湯洗七遍切焙一兩半

紫蘇葉

焙一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至

六分去滓食後服日三

杏仁湯

出聖濟總錄

治咽喉食即噎塞如有物不下

杏仁

湯浸去皮尖炒半兩

桂

去粗皮

人參

枇杷葉

拭去毛炙各一兩

右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一九含化嚥津以瘥為度

治咽喉中如有物吞嚥不下宜用此方

一名下氣飲子出聖惠方

半夏

一兩湯洗七遍去滑

陳橘皮

一兩湯浸去白穢焙

桂心

一兩

訶梨勒

皮

一兩

右為散每服水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服一方每服三錢

石蓮湯

出聖濟總錄

治咽喉如有物噎塞飲食不下

石蓮子

炒取肉

人參

杵頭糖

各一分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服

食後日三

大黃散

出聖惠方

治咽喉中如有物妨悶或在左或在右

名曰蠱蓋緣積風熱於咽喉之間多為此疾先須深針結聚之處使毒氣散之

川大黃

半兩剉碎微炒

牛蒡子

一兩微炒

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

桔梗湯

出聖濟總錄

治風熱搏於咽喉如有物妨悶

桔梗

炒

半夏

湯洗七遍去滑培

右等分剉如麻豆每服五錢匕水二盞生薑七片同煎至七分去滓溫服

杵糖丸 治咽喉如有炙鬱食即噎塞

用碓杵頭細糖二合為末煉蜜和丸如彈大空腹含化一九微嚥津

藁荷方

一名順解湯  
出衛生家寶

治喉中似物吞吐不出腹脹羸

瘦亦治口舌生瘡

取白藁荷根絞汁服蠱立出如口舌生瘡以酒漬半

日含嚥漱其汁

治飛絲生於喉舌之間此亦是蛾之小者亦宜刺破

不然則以紫蘇葉細嚼湯嚥之

出瀉  
療方

玄參升麻湯治咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早辰語

言快利午後微澀



連翹

分三

升麻

分五

桔梗

分三

鼠粘子

分二

防風

分一

玄參

分二

甘草

分三

炒黃芩

分四

白殭蠶

分二

黃連

分五

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至七分去滓  
稍熱噙漱時時嚥之前證良愈

### 咽喉腫塞論

夫咽喉者生於肺胃之氣也咽者嚥也言可嚥物又謂  
之噤主通利水穀胃氣道路故為胃之系咽重十兩廣  
二寸半至胃長一尺六寸也喉嚨者空虛也言其中空

虛可以通於氣息呼吸出入主肺氣之流通故為肺之  
系喉嚨重十二兩廣二寸長一尺二寸有九節故知咽  
門與喉門並行其實兩異也若臟熱則喉腫氣塞不通  
甚則口噤若腑寒則哽哽如有物恒欲痛痒多涎唾是  
以熱則補之不熱不寒依經調之寒熱和平病不生矣  
儒門事親書云一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫  
不退藥既難下針亦無功戴人以當歸荊芥甘草煎使  
熱漱之以冷水扳其兩手不及五六日痛減腫消飲食

如故咽喉之病甚急不可妄用針藥

方

會仙救苦丹

出聖惠方

治咽喉閉塞不通有妨嚥物亦治

骨鯁

揀甘草

炒

寒水石

燒

烏魚骨

白殭蠶

各一兩

縮砂

仁

炒

白茯苓

貫衆

各半兩

射香

少許

南硼砂

象牙

末各

一錢

右為細末重羅麪糊為丸如雞豆大用硼砂為衣每

服一九噲化津合和取庚申甲子日

二參湯 治心肺蘊熱咽喉閉塞不通

玄參 紫參 白藥 大黃炒坐 山梔子去皮 地骨皮

燒

甘草

劉

柴胡

去

桑根白皮

劉

防風

去

節各

一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食後去滓

溫服

天門煎丸

出聖濟  
總錄

治咽喉腫塞

天門冬

去心  
焙

麥門冬

去心  
焙各  
一兩半

款冬花

半

貝母

去  
心

炒紫苑

去苗土  
各一兩

升麻

一兩

赤茯苓

去黑皮  
一兩半

白蜜

五兩  
酥

合一  
生地黄汁

一升

右將前十味細剉以水三升煎取一升絞去滓內地黃汁再煎至一升內酥蜜於銀器中湯上煎成膏丸如彈子大每服一九含化嚥津

烏翬膏 治喉嚨者脾胃之侯若臟熱喉則腫塞神氣不通服之

生烏翬

即射干  
十兩

升麻

三兩

羚羊角

通草

一作木通

芍藥

各二兩

生地黄

切五合

薔薇根

切一升

猪脂

二斤

艾葉

六銖生者

尤佳

右咬咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏下鳴為度去滓薄綿裹膏似杏仁大內喉中細細吞之

硼砂散 治咽喉瘡腫氣塞不通

硼砂

白殭蠶

百藥煎

川芎

各三錢

山豆根

盆硝

薄荷

紫荷車

各半兩

青黛

一錢

右為細末大人每服半錢小兒一字吹摻咽中或水

調服

升麻散

出聖惠方

治咽喉閉塞疼痛口噤

川升麻

一分

防風

半兩去蘆頭

黃耆

半兩剉

甘草

半兩炙微赤剉

細

辛

一分

黃芩

三分

羌活

半兩

杏仁

三分湯浸去皮尖雙仁麴炒微黃

羚羊

角屑

半兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫即灌之

普濟方

半夏散

出聖惠方

治心脾風熱咽喉閉塞口噤

半夏

一兩湯洗七遍去滑

玄參

一兩

犀角屑

一兩黑

豆皮

一兩

甘草

一兩炙微赤對

牛蒡子

一兩微炒

木香

半兩

枳殼

半兩

麩炒微黃去穰

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分去滓不計

時候溫灌之

射香硃砂丸

出醫方大成

治咽喉腫塞閉痛或作瘡癰或

舌本腫脹滿口生瘡津液難嚥



燒寒水石

揀淨一斤

南礪砂

三兩

鉛白霜

龍腦

各三錢

麝

香

二錢

甘草

二十兩

硃砂

一兩半

馬牙硝

生用七錢

右研勻細用甘草膏子和丸如梧桐子大硃砂為衣每服一兩丸噙化嚥津不計時候

奪命丹 治急咽喉風熱毒腫閉塞涎壅氣不得通水藥不下以致難救者

黃連

井泉石

寒水石

五倍子

去核

白礬

訶

子

去核

鉛白霜

黃丹

各三錢

右為細末每服一錢冷茶調如稀糊時時呷之或乾  
搽亦得其效如神亦治白口瘡惡瘡證

升麻湯 治喉中痛閉塞不通

升麻

劉

木通

各一兩

射干 絡石

羚羊角

鎔各三兩

芍

藥 淡竹葉

洗

杏仁

湯浸去皮尖雙

仁麴炒各半兩

右除竹葉外粗搗篩每服三錢水一盞入竹葉七片  
煎至六分去滓溫服日三

川升麻散

出聖惠方

治咽喉閉塞不通疼痛飲食不得

川升麻半兩絡石一兩當歸半兩射干半兩犀角屑半兩甘草

微赤剉杏仁半兩湯浸去皮尖微黃木通半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

犀角丸

出聖惠方

治咽喉閉塞不通含嚥

犀角屑

半兩剉

羚羊角屑

半兩

川升麻

半兩

生乾地黄

半兩

黃耆

半兩剉

馬兜鈴根

半兩

馬牙硝

一兩

右為末煉蜜和丸如棟實大每日四五度以薄綿裹

一丸燕津

皂莢煎

出聖惠方

治咽喉閉塞腫悶宜點

皂莢

七挺不蚱者

四字古錢

二十文

搗麻根

一大握

天劍根

一握洗淨

白蘭刺根

一大握

硝石

一兩細研

白鹽

一兩西

礪砂

一兩細研

右先以皂角槌碎以水二升浸一宿熟按濾過以煎諸草根及古錢至一升濾去滓却下硝石等末煎待汁稍稠便入錫一兩更煎候如稀錫放冷以筋頭及鷄翎頻頻點於咽門腫處効

玄參散

出聖惠方

治熱毒伏在心脾攻於咽喉心胸脹滿

口噤

玄參

一兩

牛蒡子

一兩 微炒

木香

半兩

犀角屑

一兩

甘草

一兩 微炙

赤剉

桑根白皮

一兩 剉

黑豆皮

半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時  
候溫溫灌之

無比散

出濟生拔粹方

治咽喉

青黛 白殭蠶 甘草 馬牙硝 板藍根 薄

荷 桔梗

各等分

右為細末乾摻煉蜜為丸噙化亦可

藜蘆散

出朱氏集驗方

治咽喉

藜蘆 白礬

少煨各三錢

猪牙皂角

三條蜜炙

雄黃

一錢 粉草

北薄荷

各二錢

右為細末乾服少許如喉閉塞用竹管子吹入即愈

乳香散

出朱氏集驗方

治咽喉

乳香 青黛 朴硝 硼砂 粉草 雄黃

右各等分為細末乾下一字

茯苓湯

治咽喉閉塞不利

方見本門咽  
喉不利類

治咽塞閉不利

用馬屁勃煎濃汁灌之

漏蘆丸

治臟腑積熱發為腫毒時疫疔疽頭面洪腫

咽噎堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆 升麻 大黃 黃芩 藍葉 玄參

各三兩

右為粗末每服二錢水煎腫熱甚加芒硝二錢半

射干丸

出聖惠方

治咽喉閉塞不通含化

射干

一兩

川升麻

一兩

豆豉

半兩

芎藭

半兩

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙

仁麴炒

甘草

半兩炙微赤剉

右為末煉蜜和丸如半棗大每日四五度以新綿裹

一丸含嚥津

治咽喉閉塞口噤

出聖惠方

桂心

一兩

羌活

一兩

石膏

三兩

甘草

半兩

生剉

川升麻

半兩

羚羊

角屑

半兩



右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫溫灌之

五香散

出衛生家寶方

治咽喉腫病諸惡氣結塞不通急宜

服之

出醫方大成

木香

沉香

鷄舌香

薰陸香

各一兩

麝香

研三分

右為末入麝香研令勻每服二錢水一中盞煎至六

分溫服不計時候

通氣散

出瘡科精要

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通

用之取嚏噴七八遍洩出其毒則瘡若看病之人用此藥必不傳染

玄胡

半一兩

藜蘆

兩半

躑躅花

半二錢

川芎

猪牙皂角

各一兩

右為細末每用紙撚子蘸一米許絰於鼻中取嚏為効

硼砂散

一名真聖散

治咽喉閉塞

出王氏博濟方

硼砂

研

膽礬

研各一分

馬牙硝

研各半兩

龍腦

一錢

鉛白霜

三錢

右研細每以筋頭點於懸癰子兩邊如開口不得以  
管吹之立效

龍腦散

出聖惠方

治咽喉閉塞疼痛

龍腦

一分石膏

二兩細研水飛過

滑石

半兩

硃砂

一分

硼砂

一分

右細研為散不計時候以新汲水調下半錢綿裹含

嚥津亦得

升麻丸

出聖惠方

治咽喉閉塞不通

川升麻

半兩

白礬

一分

馬蘭子

一分

馬牙硝

一分

玄參

一分

右為末煉蜜和丸如棗子大用薄綿裹常含一丸  
嚙津

治咽喉閉塞口噤方

出聖惠方

皂莢針

一兩剉

楸白皮

一兩剉

芎藭

三分

羌活

三分

桂心

三分

右為散每服水一中盞煎至六分去滓拗口溫溫灌之

射干丸

出濟生方

治腑寒咽門不能嚙

射干

麤炒黃

杏仁

麤炒黃

玄參

一方作人參

附子

炮去皮臍

桂心

不見火  
各等分

右為細末煉蜜和丸如雞豆大每服一九以新綿裹

噙嚥

漱口地黄散

出御醫  
院方

治脾熱風熱上攻咽喉腫痛生

瘡閉塞不通或生舌脹

黃芩

八兩

甘草

生二兩半

荊芥穗

二兩

薄荷葉

一兩

右為細末每用二錢水一盞入薄荷少許煎三兩沸

去滓熱漱冷不計時候

四神散

川大黃 寒水石

各一兩

牛蒡子 芒硝

各半兩

右為細末新水調塗腫上咽喉腫塞生蜜調時時含  
噉化津

救生散

一名如聖散

治時疾頭面腫咽喉腫塞氣息難通

方見口舌咽  
喉門喉痺類

山豆根

一兩

北大黃

川升麻

朴硝

生各半兩

右為末煉蜜丸如皂子大每一粒以薄綿包少痛便

含燕液

泄熱湯 治咽喉閉塞不通

大黃

炮

甘草

炙各一兩

芒硝

研

防風

去叉各半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎八分去滓溫服不計時候

如聖散

出御生膏鑑

治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下

牙關緊急不省人事

雄黃

細研

白礬

飛過

藜蘆

厚去皮用心並生用

猪牙皂角

去皮炙黃

右各等分為細末每服一豆大各鼻內搐立効

立通散 治咽喉閉塞不通

蜒蚰

陰炙二七條

礬

半生半燒一分

白梅肉

燒燥二七枚

右為散每服半錢匕吹入咽內或水調下得吐立通

消毒散 治喉腫

當歸 荊芥 甘草

各等分

右為末水煎五錢去滓漱

欬金散 治咽喉至重者



欝金

兩枚

白僵蠶

鴨嘴膽礬

各半兩

全蝎

兩箇

山豆根

二錢半

猪牙皂角

去皮

雄黃

一錢

巴豆

二七粒用七粒同礬火煨用七粒去

生油

右為細末每服半錢新汲井水加好茶脚多調用稀稠得所時復嚥下如口噤以巴豆油紙捻成條子燒咽搐鼻自然開口却以酸黃子醋調用鷺毛拂患處痰涎出為度覺不快更進無害

治咽喉閉塞不通含嚥

牛蒡子

半兩

馬牙硝

半兩

甘草

半兩  
炙

右為末煉蜜和丸如半棗大日四五度以新綿裹一

丸含嚥津

治咽喉閉不通

出聖  
惠方

赤黃糞汁

合一

生薑汁

合一

童子小便

合一

右相和攪令勻徐徐灌入喉中即立通

膽礬散

出直  
指方

治酒麪熱盛咽喉腫結閉塞

鴨嘴膽礬

半錢

全蝎

二  
个

右為末以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出次用生  
青薄荷研細并水調下令吐出毒涎即愈未吐再服  
此金散 治咽喉閉塞不通

白殭蠶

直者用生蛇蛻皮燒灰

右等分細研為散每服半錢匕擦咽中嚥津神効不  
計時候

硃砂散

出聖惠方

硃砂 馬牙硝

各等分

右細研令勻用銅筋頭於水中蘸溫搗藥末點於

喉中

又方

出聖惠方

馬蘭花

二兩蔓荊子一兩

右為散每服不計時候以煖水調下一錢

治咽喉閉塞口噤方

出聖惠方

羌活

三兩細研

牛蒡子

二兩杵羅為末

右先以水三大盞煎羌活取一大盞半去滓入白礬

去毒丸 治一切喉風閉塞咽喉

青綠

信州者  
煨散赤

胡粉

右味等分研為末醋煮麪糊丸如皂子大每服一九  
薄荷煖酒磨化下如口不開用白殭蠶末一字吹入  
鼻內口即開吐下毒立止

治風熱閉塞咽喉遍身浮腫方

出聖  
惠方

用牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下一錢匕  
立瘥一方搗碎以綿裹二錢熱水浸過含嚥津立瘥

治咽喉閉塞口噤方

出聖惠方

用雄雀糞細研每服溫水調半錢匕

治咽喉閉塞不通

出聖惠方

用桑上白耳不拘多少搗羅為末以生薑每用半匙  
綿裹含化旋旋嚥下須臾即通

治咽喉閉塞不通甚者宜用此方

出聖惠方

用無穗子皮半兩含之微微嚥之即立瘥

治咽喉閉塞腫痛水米不通方

出聖惠方

用蝸牛蟲一枚綿裹水浸含之須臾便通

治喉閉垂命不辨人方

出聖惠方

用銅黃如杏核大熱湯研之化灌之立効

治咽喉閉塞喘息不通須臾欲絕方

用地龍一條爛研內雞子白相和攪令勻便瀉入口

即通

又方

出聖惠方

用猪牙皂莢三挺塗酥炙令黃搗羅為末每服蜜

水調半錢

治咽閉

用臘月猪尾燒末水服之

又方

用含雞屎白

治咽喉疾

用臘月猪膽一個同枯礬大黃青黛甘草牙硝為細末入在猪膽內陰乾為細末用一字吹之



治喉風腫

用鴨嘴膽礬為細末醋煎一二沸呷入口吐即愈如吐不止呷米飲即止

青金散 治咽喉

出儒門事親書

用益元散加薄荷青黛生蜜丸如彈子大噙化治咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

用生雞子一顆開頭取白去黃着米酢拌煆火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過一二瘥

治喉閉咽塞不通甚者

用巴豆去皮針線穿嚙入擗出一方用一枚去外皮  
鑽中心綿裏令有出氣處內於鼻隨腫左右時時吸  
氣通立効

治喉碧玉散

一名羅青散  
出御醫院方

治心肺熱上攻咽喉腫痛

閉塞水漿不下或生喉癰重舌木舌腫脹並可服之

方見口舌咽

喉門喉痺類

如聖湯 治咽喉噎塞咳濃血者

桔梗

二兩

甘草

炒

陳皮

半夏

姜汁各一兩

右為粗末每服三錢水一中盞半生薑七片煎至五分去滓溫服食後日三

大青煎

出聖濟總錄

治喉中熱塞及舌上腭生瘡

大青

黃蘗

去粗皮蜜炙

升麻

射干

薔薇根

半兩

白蜜

竹葉

細切一握

生地黃

半兩

玄參

一兩

天門冬

去心焙半兩

白蜜

二兩

右除蜜細研用水三升煎取一升去滓下蜜再煎成

膏每服半匙頭含化嚥津不計時候

治咽喉痛

用馬勃去膜以蜜橘拌炒以水調呷之

治咽喉閉塞及噎湯水難下宜服此方

用牛涎一大盞入少許鹽攪和頓服立瘥

治咽喉閉塞腫痛水米不通方

用白礬如碁子大含之須臾便通

礬硝散

治咽喉閉塞腫痛

方見本門  
喉痺類

治一切咽喉壅熱腫閉不能嚥物口舌生瘡舌根緊強  
言不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 硼砂 焰硝 甘草

各等分

右為細末每用手指捻摻於喉中嚥津或冷水送下  
頻頻嚥之

治喉中塞

以懸釣莖燒為末服之良



普濟方卷六十二